

1. Remarquons d'abord que $x^2 + y^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Première paramétrisation : Coordonnées cylindriques centrées au point $(1, 0, 0)$:

$$x - 1 = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

— (x, y, z) vérifie $x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow r = 1$.

— (x, y, z) vérifie $x^2 + y^2 + z^2 = 4 \Leftrightarrow (1 + r \cos \theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta + z^2 = 4$.

$$\text{et donc } (x, y, z) \in C \Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \text{ et } 1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + z^2 = 4 \\ 0 < \theta < \pi \text{ et } z > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow r = 1 \text{ et } z^2 = 2(1 - \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi, \quad z > 0$$

$$\Leftrightarrow r = 1, \quad z = \sqrt{2(1 - \cos \theta)}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

Ceci motive la paramétrisation suivante

$$\alpha(\theta) = (1 + \cos \theta, \sin \theta, \sqrt{2(1 - \cos \theta)}) \text{ pour } 0 < \theta < \pi.$$

Notons que $\sqrt{2(1 - \cos \theta)}$ est strictement croissante sur $(0, \pi)$. On vérifie que $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une représentation paramétrique régulière de C et que (C, T_α) va du point $(2, 0, 0)$ au point $(0, 0, 2)$.

Donc

$$\begin{aligned} & \int_{\vec{C}} y dx - (x - 1) dy + z dz \\ &= \int_0^\pi [\alpha_2(\theta) \alpha_1'(\theta) - (\alpha_1(\theta) - 1) \alpha_2'(\theta) + \alpha_3(\theta) \alpha_3'(\theta)] d\theta \\ &= \int_0^\pi [-\sin^2 \theta - \cos^2 \theta + \{2(1 - \cos \theta)\}^{1/2} \{2(1 - \cos \theta)\}^{-1/2} \sin \theta] d\theta \\ &= \int_0^\pi (-1 + \sin \theta) d\theta = -\pi + 2. \end{aligned}$$

Seconde paramétrisation : En coordonnées sphériques (centrées en $(0,0,0)$) :

$$x = r \sin \theta \sin \varphi \quad y = r \sin \theta \cos \varphi \quad z = r \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

(x, y, z) vérifie $x^2 + y^2 + z^2 = 4 \Leftrightarrow r = 2$.

(x, y, z) vérifie $x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow \sin \theta = 0$ ou $\sin \theta = \sin \varphi$.

(x, y, z) dans le premier octant $\Leftrightarrow x > 0, y > 0$ et $z > 0$.

Or $x > 0 \Rightarrow \sin \theta \neq 0$, d'où $\sin \theta = \sin \varphi$. Autrement dit, $\theta = \varphi$ ou $\theta = \pi - \varphi$.

$z > 0 \Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow \theta \in (0, \pi/2)$.

$y > 0 \Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow \theta = \varphi$.

$$\text{Donc } (x, y, z) \in C \Leftrightarrow \begin{cases} r = 2, \theta = \varphi \\ 0 < \theta < \pi/2 \end{cases}.$$

On obtient donc la paramétrisation :

$$\beta(\theta) = (2 \sin^2 \theta, 2 \sin \theta \cos \theta, 2 \cos \theta) \text{ pour } 0 < \theta < \pi/2.$$

On observe que $\beta(0) = (0, 0, 2)$ et $\beta(\pi/2) = (2, 0, 0)$ et qu'il faut donc choisir $-\beta'(\theta)/\|\beta'(\theta)\|$ comme vecteur tangent pour avoir la bonne orientation.

Donc

$$\begin{aligned} & \int_{\vec{C}} y dx - (x-1) dy + z dz \\ &= - \int_0^{\pi/2} \{8 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - 2(2 \sin^2 \theta - 1)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - 4 \sin \theta \cos \theta\} d\theta \\ &= - \int_0^{\pi/2} \{2 \sin^2(2\theta) + 2 \cos^2(2\theta) - 2 \sin(2\theta)\} d\theta \\ &= - \int_0^{\pi/2} \{2 - 2 \sin(2\theta)\} d\theta = -\{2\theta + \cos(2\theta)\} \Big|_0^{\pi/2} = 2 - \pi. \end{aligned}$$

2. Soit $\beta(t) = t(2, 1) + (1-t)(4, 5) = (-2t+4, -4t+5)$ pour $t \in [0, 1]$. On observe que $\beta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une représentation paramétrique de \vec{C}_1 et on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{\vec{C}_1} xy dx + x^2 dy &= \int_0^1 \beta_1(t)\beta_2(t)\beta_1'(t) + \beta_1^2(t)\beta_2'(t) dt \\ &= \int_0^1 (-2t+4)(-4t+5)(-2) + (-2t+4)^2(-4) dt \\ &= (-2) \int_0^1 (-2t+4)\{-4t+5-4t+8\} dt \\ &= -4 \left(\frac{23}{2} + \frac{8}{3} \right) = -\frac{170}{3}. \end{aligned}$$

Notons d'abord que $\alpha(1) = (2, 1)$ et $\alpha(\frac{5}{3}) = (4, 5)$ et donc que $\alpha(t)$ est bien un chemin orienté allant de $(4, 5)$ à $(2, 1)$. On trouve alors que

$$\begin{aligned} \int_{\vec{C}_2} xy dx + x^2 dy &= - \int_1^{5/3} \alpha_1(t)\alpha_2(t)\alpha_1'(t) + \alpha_1^2(t)\alpha_2'(t) dt \\ &= - \int_1^{5/3} (3t-1)(3t^2-2t)3 + (3t-1)^2(6t-2) dt = -58. \end{aligned}$$

3. a) L'équation $x^2 + y^2 = x$ est équivalente à $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 - 1/4 = 0$.
Les coordonnées polaires centrées au point $(\frac{1}{2}, 0)$ avec un rayon de $\frac{1}{2}$ sont

$$x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cos \theta, \quad y = \frac{1}{2} \sin \theta.$$

Une paramétrisation de C_1 en tant que chemin entre les points $(1, 0)$ et $(0, 0)$ est donc $\alpha_1 : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $\alpha_1(\theta) = (\frac{1}{2}(1 + \cos \theta), \frac{1}{2} \sin \theta)$. Noter que $\alpha_1|_{]0, \pi[}$ est régulière et que $\alpha_1(0) = (1, 0)$ et $\alpha_1(\pi) = (0, 0)$.


- b) Par un raisonnement analogue on obtient $\alpha_2 : [\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $\alpha_2(\theta) = (\frac{1}{2}(1 + \cos \theta), \frac{1}{2} \sin \theta)$.

c) Par définition

$$\begin{aligned} \int_C (x+y) ds &= \sum_{i=1}^2 \int_{C_i} (x+y) ds \\ &= \left(\int_0^\pi + \int_\pi^{2\pi} \right) [\alpha_1(\theta) + \alpha_2(\theta)] \|\alpha'(\theta)\| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2}(1 + \cos \theta) + \frac{1}{2} \sin \theta \right] \frac{1}{2} d\theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

car $\alpha'(\theta) = (-\frac{1}{2} \sin \theta, \frac{1}{2} \cos \theta)$ et donc $\|\alpha'(\theta)\| = 1/2$.

4. a) L'application $\alpha \in C^\infty((-\pi/2, \pi/2), A)$ et il existe $\alpha^{-1} \in C^0(A, (-\pi/2, \pi/2))$ car l'application $\sin t$ restreinte à $(-\pi/2, \pi/2)$ est strictement croissante : donc α est un homéomorphisme. Cependant, $\alpha'(0) = 0$ et donc α n'est pas une représentation paramétrique régulière de A .



- b) Le fait que α n'est pas une représentation paramétrique régulière de A n'est pas suffisant pour affirmer que A n'est pas un arc régulier ! Pour le montrer, il faut encore prouver *qu'il n'existe aucune représentation paramétrique régulière de A* . Admettons par l'absurde que $\beta : J \rightarrow A$ est une représentation paramétrique régulière de A . Alors, pour tout $s \in J$, il existe $t(s) \in (-\pi/2, \pi/2)$ tel que $\beta(s) = (\cos^3 t(s), \sin^3 t(s))$ car par hypothèse on a $\text{Im } \beta = \text{Im } \alpha$. On a aussi que

$$\beta_1(s)^{2/3} + \beta_2(s)^{2/3} = 1,$$

pour tout $s \in J$.

Soit $s_0 \in J$ le point tel que $\beta(s_0) = \alpha(0) = (1, 0) \in \mathbb{R}^2$, montrons que $\beta'(s_0) = (0, 0)$.

D'une part,

$$\beta_1'(s_0) = 0 \quad \text{car} \quad 1 = \beta_1(s_0) = \max_{s \in J} \beta_1(s).$$

D'autre part, en dérivant par rapport à s la relation qui lie β_1 et β_2 , on obtient

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} (\beta_1(s)^{2/3} + \beta_2(s)^{2/3}) &= \frac{d}{ds} 1 \\ \Rightarrow \frac{2}{3} \beta_1(s)^{-1/3} \beta_1'(s) + \frac{2}{3} \beta_2(s)^{-1/3} \beta_2'(s) &= 0, \end{aligned}$$

pour tout $s \neq s_0$ (car $\beta_1(s) > 0$ pour tout $s \in J$ et $\beta_2(s) \neq 0$ pour tout $s \in J \setminus \{s_0\}$).

$$\Rightarrow \beta_2'(s) = - \left(\frac{\beta_2(s)}{\beta_1(s)} \right)^{1/3} \beta_1'(s),$$

pour tout $s \neq s_0$.

Or β est une représentation paramétrique régulière, donc β est de classe C^1 sur J . Par conséquent,

$$\beta_2'(s_0) = \lim_{\substack{s \rightarrow s_0 \\ s \neq s_0}} - \left(\frac{\beta_2(s)}{\beta_1(s)} \right)^{1/3} \beta_1'(s) = - \left(\frac{\beta_2(s_0)}{\beta_1(s_0)} \right)^{1/3} \beta_1'(s_0) = 0.$$

car $\beta_1(s_0) = 1$ et $\beta_2(s_0) = 0$. Donc $\beta'(s_0) = (0, 0)$ et β ne peut pas être une représentation paramétrique régulière de A .

On conclut donc que A n'admet aucune représentation paramétrique régulière et n'est donc pas un arc régulier.

- c) Comme montré précédemment, la courbe A ne peut être vue comme une courbe régulière à cause du point $(1, 0) \in A$. Cependant la paramétrisation α est régulière entre les points $p_- = (0, -1)$ et $q = (1, 0)$ (non-compris) ainsi qu'entre les points $q = (1, 0)$ et $p_+ = (0, 1)$ (non-compris). Il existe donc une paramétrisation par longueur d'arc sur l'intérieur de chacune de ces deux parties et elle s'étend au bord de manière continue. En particulier, puisque la norme est 1 à l'intérieur, elle est aussi 1 au bord. On peut donc définir un premier chemin (régulier) entre p_- et q , puis un autre entre q et p_+ . L'union de ces deux chemins forme un chemin de p_- à p_+ et donc A est un chemin du point $(0, -1)$ au point $(0, 1)$.

5. Par définition, $C = \bigcup_{i=1}^3 C_i$ où C_1 , C_2 et C_3 sont par exemple définis par

$$\begin{aligned} C_1 &= \{(t, 0) : 0 \leq t \leq 1\}, \\ C_2 &= \{(1, t) : 0 \leq t \leq 1\}, \\ C_3 &= \{(1-t, 1-t) : 0 \leq t \leq 1\}. \end{aligned}$$

Les normes unitaires extérieures sont dans ce cas :

- $n_1 = (0, -1)$, la normale unitaire extérieure sur C_1
- $n_2 = (1, 0)$, la normale unitaire extérieure sur C_2
- $n_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$, la normale unitaire extérieure sur C_3 .

Le flux de f vers l'extérieur de C est donc

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \int_{C_i} \langle f, n_i \rangle ds &= \int_0^1 \langle f(t, 0), (0, -1) \rangle dt + \int_0^1 \langle f(1, t), (1, 0) \rangle dt \\ &+ \int_0^1 \langle f(1-t, 1-t), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1) \rangle \sqrt{2} dt \\ &= \int_0^1 (-1) dt + \int_0^1 t dt + \int_0^1 1 dt = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6. i. On trouve que les dérivées partielles de α sont $\frac{\partial}{\partial x} \alpha(x, y) = (1, 0, y)$ et $\frac{\partial}{\partial y} \alpha(x, y) = (0, 1, x)$. Donc $|\frac{\partial}{\partial x} \alpha \wedge \frac{\partial}{\partial y} \alpha|(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$ pour tous $(x, y) \in \Omega$.

ii. Par définition de l'intégrale de surface on a

$$\int_S 1d\sigma = \int_{\Omega} \left| \frac{\partial}{\partial x} \alpha \wedge \frac{\partial}{\partial y} \alpha \right| (x, y) dx dy = \int_{\Omega} \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

En faisant le changement de variables $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ avec $\theta \in]0, 2\pi[$ et $r \in]0, 1[$, on trouve

$$\int_S 1d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta = \frac{2\pi}{3} \left(2^{\frac{3}{2}} - 1 \right).$$